





レジメンセット名称	SOX療法 (TS-1 +oxaliplatin)	インターバル日数	21日	適応	治癒切除不能な進行・再発の胃癌
-----------	------------------------------	----------	-----	----	-----------------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食注	点滴静注	末梢	30分間	↓																											
	グラニセトロン注																															
	デキサート注射液																															
2	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	2時間	↓																											
	オキサリプラチン注																															
	デキサート注射液																															
3	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	15分	↓																											
4	TS-1				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	休薬期間													
					day1夕より										day15朝まで																	



レジメンセット名称	TS-1+DOC療法	インターバル日数	3週間毎	適応	再発・切除不能進行胃がん
-----------	------------	----------	------	----	--------------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食注	点滴静注	末梢	30分間	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	60分間	↓																											
	ドセタキセル注																															
3	生食注	点滴静注	末梢	15分間	↓																											
内服																																
	TS-1(内服)	分2 朝夕食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
																	休薬															

















レジメンセット名称	アービタックス+FOLFIRI (インフューザー)	インターバル日数	アービタックス 1週間 FOLFIRI療法 2週間	適応	EGFR陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
-----------	------------------------------	----------	------------------------------	----	----------------------------

Rp	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	生食注	点滴静注	メイン	15分	↓																														
	デキサート注射液																																		
	ポララミン注射液																																		
1は2開始30～60分前より開始																																			
2	生食注	点滴静注	メイン	初回 2時間 2回目以降 1時間	↓																														
	アービタックス																																		
3	生食注	点滴静注	メイン	30分間	↓																														
	グラニセロン静注液																																		
	デキサート注射液																																		
4	5%ブドウ糖液	点滴静注	メイン	2時間	↓																														
	レボホリナート点滴静注																																		
5	5%ブドウ糖液	点滴静注	サブ	2時間	↓																														
	イリノテカン注																																		
6	生食注	静注	メイン	5分間	↓																														
	5-フルオロウラシル注																																		
7	生食注	インフューザー	メイン	48時間	↓																														
	5-フルオロウラシル注																																		
【悪心・嘔吐対策】(必要に応じて)																																			
内服処方: デカドロン錠 2×MA							●	●	●																										







レジメンセット名称	アバスタチン/CPT-11+TS-1(IRIS)4 週1クール	インターバル日数	day1・15 CPT-11/アバスタチン投与 + TS-1 14日間投与 14日間休薬	適応	切除不能進行・再発の大腸癌
-----------	------------------------------------	----------	---	----	---------------

Rp	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食注	点滴静注	末梢	30分間	↓																													
	グラニセトロン静注液																																	
	デキサート注射液																																	
2	生食注	点滴静注	CVポート	初回 90分 2回目 60分 3回目以降30分	↓																													
	アバスタチン注射液																																	
2	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	90分間	↓																													
	イリノテカン注																																	
3	生食注	点滴静注	フラッシュ用	全開	↓																													
4	TS-1	分2 朝夕食後				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休薬期間																







レジメンセット名称	アバスチン/CPT-11+XELODA (XELODA)3週1クール	インターバル日数	day1 CPT-11/アバスチン投与 +カペシタビン 2週投与1週休薬	適応	切除不能進行・再発の大腸癌
-----------	---------------------------------------	----------	---	----	---------------

Rp	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	生食注	点滴静注	末梢	30分間	↓																															
	グラニセロン静注液																																			
	デキサート注射液																																			
2	生食注	点滴静注	末梢	初回 90分 2回目 60分 3回目以降30分	↓																															
	アバスチン注射液																																			
2	5%ブドウ糖液	点滴静注	末梢	90分間	↓																															
	イリノテカン注																																			
3	生食注	点滴静注	末梢	15分間	↓																															
4	カペシタビン	分2 朝夕食後				○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	休薬期間																
						day1タより												day15朝まで																		































































レジメンセット名称	TS-1+CBDCA+BV療法	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-----------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン注				↓																											
	デキサート注				↓																											
2	生食	点滴静注		1時間30分	↓																											
	カルボプラチン注				↓																											
3	生食	点滴静注		1回目90分 2回目60分 3回目以降30分	↓																											
	ベバシズマブ				↓																											
4	生食	点滴静注		30分	↓																											
5	エスワンタイホウ配合OD錠	体表面積	朝夕 分2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		2週投与1週休薬																														



レジメンセット名称	アバスチン(3W)+タルセバ	インターバル日数	3週間	適応	非小細胞肺癌
-----------	----------------	----------	-----	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注	1回目	90分	↓																											
	アバスチン		2回目	60分	↓																											
			3回目以降	30分																												
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	タルセバ内服	食事の1時間以上前又は食事の2時間以降に1日1回経口投与																														

レジメンセット名称	アブラキサン単独	インターバル日数	週1回投与を3週間連続/1コース	適応	非小細胞肺癌
-----------	----------	----------	------------------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	生食	点滴静注		5分	↓																														
	デキサート注射液																																		
2	生食	フラッシュ用		5分	↓																														
3	生食	点滴静注(シリンジポンプ)		30分	↓																														
	(血)アブラキサン																																		
4	生食	点滴静注		5分	↓																														

レジメンセット名称	アリムタ	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	アリムタ+アバスチン	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン注																															
	デキサート注																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
4	生食	点滴静注		1回目90分	↓																											
	アバスチン注			2回目60分																												
				3回目以降30分																												
5	生食	点滴静注		30分	↓																											



レジメンセット名称	カルセド	インターバル日数	3日間連日投与後、 3~4週間毎	適応	小細胞肺癌・非小細胞肺癌
-----------	------	----------	---------------------	----	--------------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	5%ブドウ糖	点滴静注	メイン	90分	↓	↓	↓																									
2	生食	点滴静注	側管	30分	↓	↓	↓																									
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注																															
3	生食	点滴静注	側管	5分	↓	↓	↓																									
	カルセド注																															



レジメンセット名称	カルボプラチン+アリムタ	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	--------------	----------	------	----	--------

Rp	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
4	生食	点滴静注		15分	↓																											



レジメンセット名称	カルボプラチン+アリムタ+アバスタチン	インターバル日数	21日間	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注																															
2	生食	点滴静注		10分	↓																											
	アリムタ注																															
3	生食	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
4	生食	点滴静注		1回目90分	↓																											
	アバスタチン注			2回目60分																												
				3回目以降30分																												
5	生食	点滴静注		15分	↓																											

レジメンセット名称	カルボプラチン+イリノテカン	インターバル日数	4週間毎	適応	小細胞肺癌
-----------	----------------	----------	------	----	-------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		30分	↓																											
	アロキシ																															
	デキサート注射液																															
2	5%ブドウ糖	点滴静注		60分	↓																											
	イリノテカン																															
3	5%ブドウ糖	点滴静注		60分	↓																											
	カルボプラチン注																															
4	生食	点滴静注		15分	↓																											
5	生食	点滴静注		30分									↓								↓											
	グラニセトロン静注液																															
	デキサート注射液																															
6	5%ブドウ糖	点滴静注		60分									↓								↓											
	イリノテカン																															
7	生食	点滴静注		15分									↓								↓											





レジメンセット名称	キイトルーダ+カルボプラチン+アリムタ	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食	点滴静注		15分	↓																													
2	生食	点滴静注		30分	↓																													
	キイトルーダ注																																	
3	生食	点滴静注		15分	↓																													
4	生食	点滴静注		30分	↓																													
	グラニセトロン静注液																																	
	デキサート注射液																																	
5	生食	点滴静注		10分	↓																													
	アリムタ注																																	
6	生食	点滴静注		60分	↓																													
	カルボプラチン注																																	
7	生食	点滴静注		15分	↓																													

レジメンセット名称	キイトルーダ+アリムタ(維持)	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-----------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食	点滴静注		15分	↓																												
2	生食	点滴静注		30分	↓																												
	キイトルーダ注																																
3	生食	点滴静注		15分	↓																												
4	生食	点滴静注		30分	↓																												
	グラニセトロン静注液																																
	デキサート注射液																																
5	生食	点滴静注		10分	↓																												
	アリムタ注																																
7	生食	点滴静注		15分	↓																												

レジメンセット名称	キイトルーダ+カルボプラチン+アブラキサン療法	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	-------------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	投与ルート	点滴時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注		15分	↓																											
2	生食 キイトルーダ注	点滴静注		30分	↓																											
3	生食	点滴静注		15分	↓																											
4	生食 アロキシ デキサート注射液	点滴静注		30分	↓																											
5	生食	フラッシュ用		5分	↓																											
6	生食 (血)アブラキサン	点滴静注 (シリンジポンプ)		30分	↓																											
7	生食	フラッシュ用		5分	↓																											
8	5%ブドウ糖 カルボプラチン	点滴静注		1時間	↓																											
9	生食	点滴静注		15分	↓																											
10	生食 デキサート注射液	点滴静注		5分																												
11	生食	点滴静注		5分																												
12	生食 (血)アブラキサン	点滴静注 (シリンジポンプ)		30分																												
13	生食	点滴静注		5分																												













化学療法レジメン承認申請書

レジメンセット名称	テセントリク+CBDCA+アブラキサン	インターバル日数	3週間毎	適応	非小細胞肺癌
-----------	---------------------	----------	------	----	--------

Rp.	薬品名	手技	点滴時間	Day																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食	点滴静注	15分	↓																											
2	生食	点滴静注	初回60分 2回目以降 30分で投与可	↓																											
	テセントリク注																														
3	生食	点滴静注	15分	↓																											
4	生食	点滴静注	30分	↓																											
	グラニセトロン デキサート注射液																														
5	生食	フラッシュ用	5分	↓																											
6	生食	点滴静注 (シリンジポンプ) (血)アブラキサン	30分	↓																											
	(血)アブラキサン																														
7	生食	フラッシュ用	5分	↓																											
8	5%ブドウ糖	点滴静注	1時間	↓																											
	カルボプラチン																														
9	生食	点滴静注	15分	↓																											
10	生食	点滴静注	5分																												
	デキサート注射液																														
11	生食	点滴静注	5分																												
12	生食	点滴静注 (シリンジポンプ) (血)アブラキサン	30分																												
	(血)アブラキサン																														
13	生食	点滴静注	5分																												













































